

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2026-06-16

(25. hét)

Fenofázis: virágzás vége, tisztulás, zöldbors- zöldborsó nagyság

Nos ma reggelre beködött a táj. A páratartalom 100% volt.

A múlt heti csapadékosabb időjárás sajnos nem múlt el nyomtalanul. Kedvező fertőzési feltételek alakulhattak ki a kórokozó gombák számára. Múlthét kedden (06.10) az országon végig söprő zivatarláncból mi sem maradtunk ki. Badacsonyan (és a borvidék több pontján) is esett jég eleinte szárazon, majd jelentős mennyiségű esőre váltott (16,0 mm). A jég verte szemek egyelőre úgy tűnik, hogy beszáradnak és kiperegnek nem okoznak későbbiekben növényvédelmi problémát.

A szőlő továbbra is jól érzi magát nő, mint a veszedelem.

A szőlőnek rendkívül kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően a hajtásnövekedés folyamatos volt. A visszahajló vitorlák már egyes fajták estében átláthatatlan dzsungelt képeznek a sorok között akadályozva a gépi munkák elvégzését, valamint kedvező mikroklímát biztosítanak elsősorban a lisztharmat gomba felszaporodásához. Péter Pál ide vagy oda (június 29), lassan mérlegelni és meg kell barátkozni a csonkázás elkezdésének gondolatával is.

A borvidéken a késői fajták virágzás végén tisztulásban vannak. A bogyók a melegebb kitettebb helyeken zöld bors- illetve zöldborsó, míg a korai és középérésű fajták bogyói zöldborsó nagyságúak a fürtök lassan már lehajlanak.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 16,7 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt meleg párás időjárásnak köszönhetően **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra veszély jelenleg alacsony preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó vagy kontakt készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék (az előrejelzések alapján a következő napokban már nem várható) hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenésére és fürt tünetekre is lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges, de az erősebben jégvert fürtök esetében indokolt lehet.

Feketerothadás veszélye jelenleg alacsony.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A tavaly fertőzött tőkék már „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. **Most jött el az első „hegy” bejárásnak az ideje!** Az első

rovarölőszeres kezelést követően a fertőzés gyanús tőkét célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A gócpontok felszámolására kb. 10 nap áll rendelkezésre utána a lárvák olyan fejlettségbe kerülnek, hogy a szőlő arany színű sárgaság fitoplazmát terjeszteni képesek.** Az ESCA-s szőlőtőkét részleges amputálásokkal egy pár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Napról napra melegszik az idő. Kedden még 25 °C maximum hőmérséklet, majd ezt követően a hét közepén 28-29 °C, hét végére 31-35 °C maximum hőmérséklet is lehet. Beköszönt az igazi nyár és ezzel együtt az első hőhullámmal a hőségnapok száma is gyarapodni fog. Szerda és csütörtök kissé szeles nap lehet. „Jelentősebb” csapadék kedd éjjel és vasárnap délután várható.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

A hatalmas hajtásnövekmény dunsztot képez a szőlősorokban. Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkezők a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvény szinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

A zöld cserebogarak rajzása folyamatos.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen szőlő virágzásban vagy közvetlen virágzás után kell védekezni, melynek most jött el az ideje (június 10-18). Badacsonyban az amerikai szőlőkabóca L3-as lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. **Kifejezetten a kabócák ellen szőlő virágzásban vagy közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, amikor a lárvák zöme eléri az L2 lárvastádiumot, de már megjelentek az L3-as lárvák is.**

Az elhúzódozó lárvakelést jól jelzi, hogy még mindig vannak L1-es lárvák. Törzstisztítás elvégzésével nagy mértékben csökkenthetjük a kikelt lárvák egyedszámát, valamint a kijuttatandó rovarölő szerek hatékonyságát. A fiatal L1-es lárvák igen érzékenyek, a talaj közelében lévő törzshajtásokon érzi igazán jól magát. A törzshajtások eltávolításával kedvezőtlen életteret tudunk kialakítani számára.

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseink szerint

nagyobb számú kabócalárva és majd a későbbiek során kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal megjelent 2026/I. védekezési felhívását!

A benne foglaltak minden szőlőtulajdonos számára kötelező!

A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSGÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2026. 06. 16.